

RECOGIDA DE MUESTRAS

Servicio de Farmacia. Hospital General Universitario de Castellón

	FÁRMACO	Tipo prueba	¿DESDE CUÁNDO?	MOMENTO EXTRACCIÓN	TUBO RECOGIDA		
ANTIÉPILEPTICOS	CARBAMACEPINA	Rutinaria-urgente	21-28 días	Cmin	TUBO SECO 5 mL		
	FENITOINA	Rutinaria-urgente	7-10 días				
	FENOBARBITAL/PRIMIDONA	Rutinaria-urgente	10-20 días				
	LAMOTRIGINA	Rutinaria- no urgente	5-7 días				
	LEVETIRACETAM	Rutinaria-urgente	2-3 días				
	OXCARBACEPINA	No rutinaria	2-3 días				
	TOPIRAMATO	Rutinaria-no urgente	7 días				
	VALPROICO	Rutinaria-urgente	2-3 días				
ANTIMICROBIANOS	DAPTOMICINA	No rutinaria	4 días	Cmin	TUBO SECO 5 mL		
	AMIKACINA GENTAMICINA TOBRAMICINA	Rutinaria-urgente	Tras 1º dosis	1ª: PICO (30 minutos tras finalizar la perfusión I.V.) 2ª: 8 h postinfusión			
	LINEZOLID	Rutinaria-urgente	3º dosis (Antes de 4ª dosis)	Cmin			
	VANCOMICINA	Rutinaria-urgente	3º dosis (Antes de 4ª dosis)	Cmin			
	VORICONAZOL	Rutinaria-urgente	6 días Si dosis choque: 48h	Cmin (proteger tubo de la luz)			
	MEROPENEM	No rutinaria	24-48h	Cmin			
BIOLÓGICOS	ADALIMUMAB/Ac antiADA CERTOLIZUMAB /Ac antiCERT ETANERCEPT	Rutinaria- no urgente No rutinaria No rutinaria	Según protocolo	Cmin	TUBO SECO 5 mL		
	INFLIXIMAB /Ac antiIFX	Rutinaria-no urgente					
	USTEKINUMAB/Ac antiUSTE	Rutinaria-no urgente					
	VEDOLIZUMAB/Ac antiVEDO	Rutinaria-no urgente					
DROGAS DE ABUSO	Anfetamina, Benzodiazepinas, Cannabis, Cocaína, Éxtasis, Metadona, Opioides	Rutinaria-urgente			TUBO VACUTAINER SECO PARA ORINA		
INMUNO SUPRESORES	CICLOSPORINA	Rutinaria-urgente	3-4 días	Cmin	TUBO CON EDTA		
	EVEROLIMUS	Rutinaria-no urgente	6-8 días				
	MICOFENOLATO	Rutinaria-no urgente	5-6 días				
	SIROLIMUS	Rutinaria-no urgente	5-6 días				
	TACROLIMUS	Rutinaria-urgente	12-13 días				
OTROS	CLOZAPINA	Rutinaria-no urgente	20 días	Cmin	TUBO SECO 5 mL		
	ARIPIPIRAZOL		24 días				
	OLANZAPINA		18 días				
	RISPE/PALIPERIDONA		7 días				
	QUETIAPINA		4 días				
	DIGOXINA		Rutinaria-urgente			5-7 días Impregnación antes de 2ª dosis	Cmin ó 6-8 h post-dosis
	IMATINIB		No rutinaria			7 días	Cmin
LITIO	Rutinaria-Urgente	5-7 días	Cmin	TUBO SECO 5 mL			
METOTREXATE	Rutinaria-urgente		1ª: 12h post-inicio dosis 2ª: 23h post-inicio dosis 3ª: 36h post-inicio dosis				
PARACETAMOL	Rutinaria-urgente		Entre 4h-24h post-ingesta (intoxicación aguda)				
TEOFILINA	Rutinaria-urgente	36-48 h	Cmin				

